



# MON GUIDE THÉRAPEUTIQUE PERSONNEL POUR TAGRISSO®

Un compagnon de traitement pour les patientes et les patients auxquels TAGRISSO® a été prescrit.



# CHÈRE PATIENTE, CHER PATIENT,

## **Votre médecin vous a prescrit TAGRISSO® pour traiter de manière ciblée votre cancer du poumon.**

Depuis le moment où vous avez reçu le diagnostic de votre maladie jusqu'à aujourd'hui, vous avez dû faire face, pendant votre parcours avec le cancer, à de nombreuses émotions, des défis et certainement aussi à un grand nombre de nouvelles informations. La présente brochure a pour but de vous faciliter ce parcours, en vous fournissant des informations et des outils qui vous permettront de gérer au mieux votre vie durant la prise de TAGRISSO®.

TAGRISSO® peut contribuer à ralentir ou à stopper la croissance de la tumeur dans les poumons des patientes et patients se trouvant à un stade avancé de la maladie. À ce stade, il peut également contribuer à réduire la taille de la tumeur. Au stade précoce de la tumeur, TAGRISSO® peut contribuer à prévenir ou à retarder la réapparition de la maladie après l'ablation du tissu tumoral.

Vous avez certainement de nombreuses questions au sujet du traitement par ce médicament. Cette brochure contient des informations et des conseils pratiques sur les caractéristiques d'une thérapie ciblée telle que TAGRISSO®, sur la manière de prendre correctement le médicament, sur les effets secondaires susceptibles de survenir, ainsi que sur la manière de les prévenir ou d'atténuer les éventuels symptômes.

Cette brochure contient également un journal de traitement qui a pour but de vous aider, vous et votre médecin traitant, à suivre votre traitement par TAGRISSO®. Plus votre médecin est au courant de vos expériences, mieux il est informé et peut s'occuper de vous pendant le traitement. Votre journal de traitement vous permet de suivre l'évolution individuelle de votre maladie et de documenter votre traitement par TAGRISSO®.


Nous souhaitons que cette brochure constitue pour vous un soutien. La présente brochure ne remplace toutefois pas un entretien avec votre médecin. Veuillez toujours vous adresser à votre médecin traitant si vous avez des doutes concernant le traitement par TAGRISSO® et/ou si vous présentez d'éventuels effets secondaires.

## **Nous vous souhaitons beaucoup de force et de courage pendant votre traitement.**

L'équipe d'oncologie d'AstraZeneca

# VOTRE INTERLOCUTEUR

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations au sujet de votre traitement par TAGRISSO®, du mode d'action du médicament ou des éventuels effets secondaires, lisez la notice d'emballage ou adressez-vous à votre médecin traitant ou à votre pharmacien.



Cachet du médecin

**Cette brochure est uniquement destinée à être distribuée aux patientes et patients utilisant TAGRISSO®.**

# TABLE DES MATIÈRES

Différentes approches thérapeutiques pour le cancer du poumon.....	<b>06</b>
Stades du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC): vos options de traitement .....	<b>07</b>
Un test aide à savoir avec certitude la voie à suivre .....	<b>08</b>
Thérapie ciblée par TAGRISSO® .....	<b>09</b>
De quoi faut-il discuter avec votre médecin avant de prendre TAGRISSO®?.....	<b>10</b>
Ce à quoi il faut prêter attention avant de prendre TAGRISSO® .....	<b>11</b>
Comment prendre correctement TAGRISSO® .....	<b>12</b>
Que faire en cas d'erreur de prise?.....	<b>14</b>
Quels sont les effets secondaires possibles? .....	<b>16</b>
Effets secondaires graves .....	<b>17</b>
Comment atténuer les effets secondaires et les prévenir .....	<b>18</b>
Conseils pour l'entretien avec le médecin.....	<b>22</b>
Soutien complémentaire.....	<b>22</b>
Votre journal pour TAGRISSO® .....	<b>23</b>

# DIFFÉRENTES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES POUR LE CANCER DU POUMON

**Grâce à d'intenses efforts de recherche et au développement de nouveaux médicaments, une constatation s'est imposée de plus en plus clairement ces dernières années: il est important de décider de manière personnalisée du traitement en cas de cancer du poumon.**

Chaque tumeur est une entité complexe, présentant des caractéristiques spécifiques, telles qu'une localisation, une taille et un type de tissu particuliers. L'évaluation du cancer au moyen de la biologie moléculaire joue aujourd'hui un rôle important, tant au stade précoce qu'au stade avancé. Si un pathologiste ou un généticien humain détecte par exemple une certaine mutation dans l'ADN (modification permanente du patrimoine génétique) d'une cellule cancéreuse, cela peut être déterminant pour le choix du traitement. Voilà pourquoi de tels tests de mutation sont aujourd'hui effectués de manière systématique dans la plupart des centres de traitement.

L'utilisation de médicaments qui interviennent de manière ciblée dans le métabolisme d'une tumeur dépend

parfois du type de tissu et très souvent des caractéristiques génétiques de la tumeur. Ainsi, les patientes et les patients atteints d'un cancer du poumon ne reçoivent pas toutes et tous le même traitement.

Une décision thérapeutique personnalisée dépend donc de nombreux facteurs, et celle-ci est prise individuellement pour chaque personne afin d'obtenir le meilleur résultat thérapeutique possible.

TAGRISSO® est utilisé pour traiter un certain type de cancer du poumon, appelé cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer). L'utilisation est possible lorsqu'une mutation du gène du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR, Epidermal Growth Factor Receptor) a été détectée.



**Votre médecin vous expliquera en détail de quel type de cancer du poumon vous êtes atteint-e et quel est le meilleur traitement pour vous. Consultez votre médecin si vous avez des doutes ou si un point n'est pas clair pour vous!**

# STADES DU CANCER DU POUMON NON À PETITES CELLULES (NSCLC): VOS OPTIONS DE TRAITEMENT

**Différentes options thérapeutiques sont disponibles pour traiter le NSCLC. Le choix de l'une ou l'autre de ces options dépend essentiellement du stade de la tumeur.**


## **Stade précoce**

Si la tumeur est limitée aux poumons ou si elle n'a progressé que localement, la tumeur est souvent retirée dans le cadre d'une opération chirurgicale. Malgré l'opération, il peut arriver que certaines cellules cancéreuses subsistent et ne puissent pas être éliminées. Afin de stopper la croissance de ces cellules cancéreuses et de soutenir le succès thérapeutique de l'opération, il est donc recommandé de suivre un traitement ultérieur par chimiothérapie et/ou une thérapie ciblée, telle que TAGRISSO®. On parle alors de traitement adjuvant.

## **Stade avancé**

Si la tumeur s'est propagée dans les poumons et a atteint des ganglions lymphatiques éloignés ou a formé des tumeurs secondaires, appelées métastases, dans d'autres organes, un traitement médicamenteux est recommandé. Selon le type de cancer du poumon, il peut s'agir d'une chimiothérapie combinée, d'une immunothérapie ou d'une thérapie ciblée, telle que TAGRISSO®.

# UN TEST AIDE À SAVOIR AVEC CERTITUDE LA VOIE À SUIVRE



Pour les patientes et les patients chez qui le récepteur de l'EGF est génétiquement modifié, c'est-à-dire muté, il existe la possibilité d'une thérapie personnalisée, dite ciblée, du cancer du poumon. C'est le cas d'environ 10-15% des patientes et des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules. Afin de déterminer si une telle mutation est présente, un échantillon de la

tumeur doit être prélevé et analysé génétiquement dans un institut de pathologie. Si le résultat du test est positif («EGFR M+» ou «positif pour la mutation»), un traitement par TAGRISSO® est envisageable.

Si le résultat du test est négatif, on sait alors qu'un autre traitement est plus approprié.


# THÉRAPIE CIBLÉE PAR TAGRISSO®

## Comment agit TAGRISSO® et à quoi sert-il?

TAGRISSO®, dont le principe actif est l'osimertinib, est un inhibiteur sélectif du récepteur de l'EGF (EGFR), dont la fonction est perturbée par des mutations. TAGRISSO® agit de préférence sur les récepteurs de

l'EGF des cellules cancéreuses, en bloquant de manière ciblée leur croissance et leur multiplication. En raison de son mode d'action ciblé sur le récepteur de l'EGF, TAGRISSO® fait partie des thérapies ciblées.


Cellule  
cancéreuse



Les cellules cancéreuses se multiplient de manière incontrôlée et indépendamment du facteur de croissance EGF en raison d'une mutation au niveau du récepteur de l'EGF.

**La cellule cancéreuse peut se diviser et se propager de manière incontrôlée.**

Cellule  
cancéreuse



TAGRISSO® pénètre dans la cellule et inhibe le récepteur de l'EGF de l'intérieur, ce qui empêche la division cellulaire.

**La cellule cancéreuse ne peut pas se multiplier et se propager dans l'organisme.**



**Si vous avez des questions sur le mode d'action de ce médicament ou si vous souhaitez savoir pourquoi il vous a été prescrit, parlez-en à votre médecin.**

# DE QUOI FAUT-IL DISCUTER AVEC VOTRE MÉDECIN AVANT DE PRENDRE TAGRISSO® ?

**Informez votre médecin avant de prendre TAGRISSO® si vous prenez l'un des médicaments suivants:**

- Phénytoïne, carbamazépine ou phénobarbital – contre les crises d'épilepsie
- Rifabutine ou rifampicine – pour le traitement de la tuberculose
- Millepertuis (*Hypericum perforatum*) – médicament à base de plantes contre la dépression
- Rosuvastatine – pour faire baisser le taux de cholestérol
- Warfarine ou dabigatran – empêche la formation de caillots sanguins
- Théophylline – un médicament contre l'asthme, substance également appelée «aminophylline»
- Digoxine – pour le traitement de l'insuffisance cardiaque
- Tizanidine – pour détendre les muscles
- Aliskirène – pour faire baisser la pression artérielle
- Fexofénadine – contre les allergies



**TAGRISSO® est susceptible d'affecter le mode d'action de certains autres médicaments. Certains autres médicaments sont susceptibles d'affecter le mode d'action de TAGRISSO®.**

**Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez. Cela vaut aussi bien pour les médicaments délivrés sur ordonnance que pour les médicaments à base de plantes et les médicaments non soumis à ordonnance.**

# CE À QUOI IL FAUT PRÊTER ATTENTION AVANT DE PRENDRE TAGRISSO®

**Avant de prendre TAGRISSO®, veuillez discuter des points suivants avec votre médecin:**

## Antécédents médicaux

- Si vous avez déjà eu une pneumonie (une maladie appelée «pneumopathie interstitielle»).
- Si vous avez déjà eu des problèmes cardiaques par le passé – votre médecin voudra vous surveiller de près à ce sujet.

## Désir d'avoir des enfants

- Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez d'avoir un bébé.

## Contraception – informations pour les femmes et les hommes

Vous devez utiliser une forme efficace de contraception pendant le traitement. Informez immédiatement votre médecin de toute grossesse.

## Allaitement

Ne prenez pas ce médicament si vous allaitez. On ignore si la prise du médicament présente un risque pour votre bébé.



**Si l'un des points mentionnés ci-dessus s'applique à votre cas (ou si vous avez des doutes), veuillez demander conseil à votre médecin, à votre pharmacien ou à un professionnel de la santé avant de prendre ce médicament.**

# COMMENT PRENDRE CORRECTEMENT TAGRISSO®




**TAGRISSO® doit être pris une fois par jour:**

La dose recommandée est d'un comprimé de 80 mg une fois par jour.

## Comment prendre le médicament?



Prenez le comprimé chaque jour à la même heure.



Avalez le comprimé entier avec suffisamment d'eau. N'écrasez pas, ne divisez pas et ne mâchez pas le comprimé\*.



Vous pouvez prendre le comprimé au cours ou en dehors des repas.

\* Si vous avez des problèmes de déglutition, parlez-en à votre médecin. TAGRISSO® peut être dissous dans un verre d'eau non gazeuse.



**Prenez toujours ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Demandez conseil à votre médecin si vous avez un doute.**

## Astuces pour se rappeler la prise du médicament

TAGRISSO® vous accompagnera pendant une période plus ou moins longue, en fonction de la prescription de votre médecin traitant. Il s'agit d'une longue période pendant laquelle vous devez penser à prendre le médicament tous les jours. En effet, ce n'est que si vous prenez le médicament régulièrement et conformément aux recommandations de votre médecin que vous obtiendrez le meilleur résultat thérapeutique possible.



Le dimanche, par exemple, remplissez un semainier/pilulier pour chaque jour de la semaine suivante. Placez-le à un endroit que vous verrez à coup sûr, par exemple à côté de votre brosse à dents.



Utilisez la fonction de rappel de votre smartphone (par exemple le réveil ou les rappels du calendrier) et laissez votre compagnon numérique vous rappeler la prise de votre médicament.



Un distributeur automatique de comprimés s'avère particulièrement utile si vous devez avoir une vue d'ensemble sur différents médicaments. Il déverrouille à un moment prédéfini le compartiment dans lequel se trouvent les comprimés à prendre et vous le fait remarquer par un signal optique ou acoustique.

## Aide-mémoire à coller

Fixez cet autocollant sur votre miroir ou votre réfrigérateur, par exemple. De cette manière, vous vous souviendrez de la prise de votre médicament, même si vous avez l'esprit ailleurs.



# QUE FAIRE EN CAS D'ERREUR DE PRISE?

## Si vous avez oublié de prendre le médicament



Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez le comprimé omis dès que vous vous en apercevez. Si vous devez prendre la dose suivante dans moins de 12 heures, sautez la dose oubliée. Prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

## En cas de surdosage

Si vous avez pris une dose plus importante que la dose prescrite, prévenez immédiatement votre médecin ou l'hôpital le plus proche.

!

**N'arrêtez pas simplement de prendre ce médicament – parlez-en d'abord à votre médecin. Il est important que vous preniez ce médicament chaque jour pendant la période prescrite par votre médecin.**



# QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES?

**Comme tous les médicaments, TAGRISSO® peut provoquer des effets secondaires qui ne surviennent cependant pas obligatoirement chez toutes les patientes et tous les patients.**

**Les effets secondaires suivants sont très fréquents:**



Modifications des ongles,  
par exemple rougeur autour des  
ongles



Diarrhée



Modifications de la peau,  
par exemple éruption cutanée,  
peau sèche, démangeaisons, acné



Inflammation de la  
muqueuse buccale



Perte d'appétit



Réduction du nombre de  
plaquettes et de globules blancs

Les effets secondaires ne peuvent pas toujours être évités. Une bonne gestion des effets secondaires peut contribuer à les limiter.



**Contactez votre médecin dès que vous remarquez des effets secondaires. Votre médecin de famille peut également vous aider à gérer les effets secondaires et vous orienter vers le bon spécialiste si nécessaire.**

# EFFETS SECONDAIRES GRAVES

**Veillez informer immédiatement votre médecin si vous présentez un ou plusieurs des effets secondaires graves suivants:**

- Essoufflement soudain, accompagné de toux et de fièvre; cela peut être le signe d'une pneumonie (une maladie appelée «pneumopathie interstitielle»).
- Yeux qui pleurent, sensibilité à la lumière, douleur oculaire, yeux rouges ou modifications de l'acuité visuelle peuvent indiquer une inflammation de la cornée (kératite).
- Altération de la couleur de la peau, rougeâtre et en forme de cible sur le tronc ou taches circulaires présentant souvent des cloques au centre, décollement de la peau, ulcérations dans la bouche, la gorge, le nez et les organes génitaux, éventuellement précédés de symptômes pseudo-grippaux et de fièvre, indiquent un syndrome de Stevens-Johnson.
- Battements cardiaques accélérés ou irréguliers, vertiges, étourdissement, sensation d'oppression dans la poitrine, essoufflement et évanouissement.



**Informez immédiatement votre médecin si vous constatez l'effet secondaire grave suivant: essoufflement soudain accompagné de toux et de fièvre – cela peut être le signe d'une pneumonie.**

# COMMENT ATTÉNUER LES EFFETS SECONDAIRES ET LES PRÉVENIR



## Modifications de la peau

### Ce que vous pouvez faire pour votre peau:

- Pour prévenir les réactions cutanées, il est bon d'utiliser des crèmes ou des lotions apaisantes et hydratantes:
  - Veillez à un nettoyage en douceur avec des huiles de douche ou de bain sans parfum.
  - Pour la désinfection des mains, utilisez un désinfectant qui n'agresse pas la peau.
  - Pour la peau du visage, les crèmes hydratantes sont idéales.
  - Il convient en particulier de bien enduire les mains et les pieds, par exemple avec une crème grasse sans parfum ou une pommade contenant de l'urée.
- En cas d'éruption cutanée, vous pouvez utiliser des gels nettoyants désinfectants et dégraissants.
- En cas d'acné, vous pouvez nettoyer votre peau en douceur avec des lotions lavantes sans parfum et utiliser des crèmes hydratantes sans huile à base d'eau pour ne pas obstruer les pores de votre peau.
- Si votre peau est sèche, craquelée ou squameuse, optez pour des produits de soin hydratants, voire relipidants, exempts de parfums afin qu'ils n'irritent pas davantage votre peau.

### Ce que vous devriez éviter:

- Eau trop chaude
- Séchage par frottement vigoureux
- Trop d'exposition directe à la lumière du soleil
- Port de vêtements trop serrés
- Lavage fréquent des mains
- Contact direct avec des substances irritantes telles que les nettoyants ménagers et les jus d'agrumes
- Crèmes avec des parfums forts



## Modifications des ongles

### Voici comment prendre soin de vos ongles:

- Si le lit de l'ongle est enflammé, vous pouvez favoriser sa guérison grâce à des bains tièdes et antibactériens avec du savon de Marseille ou de la povidone iodée.
- Un baume pour les ongles peut avoir un effet soignant et protecteur.
- Marcher avec des sandales ouvertes peut être bénéfique pour vos ongles (si la saison le permet).

### Ce que vous devriez éviter:

- Ne coupez pas trop courts vos ongles des doigts et des pieds et ne les coupez pas «ronds», mais «droits», de sorte qu'ils ne puissent pas s'incarner.
- Ne portez pas de chaussures inconfortables qui appuient sur vos orteils ou vos ongles.



**En cas de problèmes persistants de la peau ou des ongles, demandez à votre médecin de vous orienter vers un-e dermatologue ou un-e pédicure médical-e.**



## Nausées et vomissements

### Voici quelques conseils en cas de nausées et de vomissements:

- Mangez de nombreux petits repas et des aliments secs entre les repas, tels que des biscottes ou des crackers, car le fait de ne pas manger renforce les nausées.
- Prenez des aliments légers, car ils ne sont pas aussi lourds sur l'estomac que les aliments sucrés ou les aliments gras.
- Buvez de l'eau au gingembre pour prévenir les nausées ou les atténuer. Pour cela, il vous suffit de verser de l'eau bouillante sur un morceau de gingembre de la taille du pouce et de laisser infuser pendant environ 10 minutes.

### Ce que vous devriez éviter:

- Évitez les odeurs de nourriture fortes et persistantes.  
Les plats tièdes et froids ainsi que les plats légèrement épicés sont moins odorants.



## Diarrhée

### Ceci peut vous aider en cas de diarrhée:

- En cas de diarrhée aiguë, commencez par consommer des aliments purement liquides, puis sous forme de bouillie, avant de reprendre une alimentation solide, afin de soulager vos organes digestifs.
- Mettez sur des aliments légèrement épicés ainsi que sur des aliments constipants comme le riz, la pomme râpée, la banane ou les myrtilles, l'eau, le cacao ou le chocolat noir.
- Veillez à boire suffisamment (environ 2 litres par jour), surtout en cas de diarrhées sévères. Buvez de l'eau ou, par exemple, une tisane au fenouil ou au cumin, du thé à la menthe poivrée ou du bouillon. Vous pouvez éventuellement recourir à des solutions d'électrolytes spécifiques.

### Ce que vous devriez éviter:

- Évitez les boissons froides, l'alcool, le café, les boissons gazeuses, les aliments riches en fibres et les légumes qui provoquent des ballonnements. La plupart des produits laitiers peuvent également aggraver la diarrhée. En outre, une consommation excessive de fructose peut entraîner des diarrhées et des maux d'estomac.



## Ballonnement et flatulences

### Voici ce que vous pouvez faire pour lutter contre les ballonnements et les flatulences:

- Mangez des aliments faciles à digérer et à faible teneur en matières grasses.
- Favorisez votre digestion avec des herbes comme le basilic, l'anis ou le cumin.
- Prenez votre temps lorsque vous mangez, et mastiquez bien.
- Stimulez le processus de digestion avec des produits grillés/torréfiés (par exemple le café) et des produits acides.
- Faites légèrement griller le pain frais et veillez à ce qu'il ne devienne pas trop foncé.

### Ce que vous devriez éviter:

- Ne consommez pas d'aliments qui provoquent des ballonnements (par exemple des légumineuses, du pain frais) ou d'aliments gras et difficiles à digérer (par exemple les aliments frits, les produits laitiers à base de lait entier).



**En cas de problèmes persistants de digestion ou de perte d'appétit, demandez à votre médecin de vous orienter vers une consultation diététique.**

# CONSEILS POUR L'ENTRETIEN AVEC LE MÉDECIN

- Notez vos questions à l'avance et apportez-les avec vous lors de l'entretien.
- Si possible, faites-vous accompagner.
- Lors de décisions importantes, il peut être utile de demander un second avis.

## SOUTIEN COMPLÉMENTAIRE

Psycho-oncologie



Société suisse pour  
le cancer du poumon



Ligue contre  
le cancer



Association suisse  
AVAC



# VOTRE JOURNAL POUR TAGRISSO®

**Votre journal de traitement vous aide, vous et votre médecin, à suivre votre traitement par TAGRISSO®. Plus votre médecin en sait sur vos expériences, mieux il pourra s'occuper de vous pendant le traitement.**

**Veillez noter ici la prise régulière des comprimés**

## Semaine de traitement

01

Jour	Date	J'ai pris mon comprimé	Aujourd'hui je me sens	Symptômes		
				Modifications des ongles	Modifications de la peau	Per d'app
Lun.	11/03	<input checked="" type="checkbox"/>	☹️☹️😊😊😊	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mar.	12/03	<input checked="" type="checkbox"/>	☹️☹️😊😊😊	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mer.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️😊😊😊	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeu.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️😊😊😊	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ven.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️😊😊😊	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	☹️☹️😊😊😊	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	☹️☹️😊😊😊	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Choisissez le symbole correspondant à votre état de santé général**

Mauvais ☹️☹️😊😊😊 Bon

Si vous présentez des effets secondaires ou des symptômes qui vous inquiètent, adressez-vous à votre médecin traitant ou à l'équipe d'oncologie. Ils vous aideront à résoudre votre problème.

Dans ce champ, vous pouvez noter d'autres aspects de votre traitement, tels que:

- les autres effets secondaires/symptômes dont vous souffrez
- les prises oubliées et leur justification
- vos impressions vis-à-vis du traitement

Effets secondaires				Remarques
Effet secondaire	Diarrhée	Inflammation de la muqueuse buccale	Autres	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maux de tête
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Légère fièvre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Si vous souhaitez des pages supplémentaires pour votre journal, vous pouvez les télécharger au format PDF.

# MON JOURNAL POUR TAGRISSO®



## Semaine de traitement

Jour	Date	J'ai pris mon comprimé	Aujourd'hui je me sens	Symptômes et effets secondaires						Remarques
				Modifications des ongles	Modifications de la peau	Perte d'appétit	Diarrhée	Inflammation de la muqueuse buccale	Autres	
Lun.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mar.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mer.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jeu.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ven.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sam.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dim.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	







# MON JOURNAL POUR TAGRISSO®



## Semaine de traitement

Jour	Date	J'ai pris mon comprimé	Aujourd'hui je me sens	Symptômes et effets secondaires						Remarques
				Modifications des ongles	Modifications de la peau	Perte d'appétit	Diarrhée	Inflammation de la muqueuse buccale	Autres	
Lun.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mar.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mer.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jeu.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ven.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sam.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dim.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



# MON JOURNAL POUR TAGRISSO®



Semaine de traitement

Jour	Date	J'ai pris mon comprimé	Aujourd'hui je me sens	Symptômes et effets secondaires						Remarques
				Modifications des ongles	Modifications de la peau	Perte d'appétit	Diarrhée	Inflammation de la muqueuse buccale	Autres	
Lun.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mar.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mer.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jeu.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ven.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sam.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dim.		<input type="checkbox"/>	☹️☹️☹️☹️☹️☹️☺️☺️☺️☺️☺️☺️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	





# MON JOURNAL POUR TAGRISSO®



Semaine de traitement

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Jour	Date	J'ai pris mon comprimé	Aujourd'hui je me sens	Symptômes et effets secondaires				Remarques
				Modification de la toux	Perte de poids	Inflammation de la gorge	Autres	
Lun.		<input type="checkbox"/>						
Mar.		<input type="checkbox"/>						
Mer.		<input type="checkbox"/>						
Jeu.		<input type="checkbox"/>	☹️ ☹️ ☹️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ven.		<input type="checkbox"/>	☹️ ☹️ ☹️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sam.		<input type="checkbox"/>	☹️ ☹️ ☹️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dim.		<input type="checkbox"/>	☹️ ☹️ ☹️	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**VOUS ÊTES À COURT DE PAGES  
DANS VOTRE JOURNAL?**



**Téléchargez d'autres pages au format PDF en scannant le code QR**

Cette brochure est fournie par AstraZeneca et a été élaborée avec l'aimable soutien du service de psycho-oncologie de l'Hôpital régional de Haute-Argovie de Langenthal.

Les informations contenues dans cette brochure sont données à titre d'information et n'ont pas pour but de remplacer un entretien avec un professionnel de la santé. Elles ne visent pas à diagnostiquer ou traiter un problème de santé ou une maladie. Si vous avez des questions au sujet de votre maladie, veuillez vous adresser à votre médecin.



AstraZeneca AG –  
Neuhofstrasse 34 – 6340 Baar  
[www.astrazeneca.ch](http://www.astrazeneca.ch)